Rossignola 1296Mtp2 Vass6R03s161-165 Collection Vassal-Montpellier 4.2688 Rossignala





Miller: O | 2 3 4 5

Désignation: Rossignola.

Clos & Planche 26 Rang S Souche 8

Vigueur: 3

Date de Véraison: 13 - 8 - 65

Date de Maturité: 4 10 - 65 + 7

Pourriture: 14

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. T.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

S 1 O saveur: S m - ar fox - herb.

S 2 disc - sph - ell. - ov.

Obev. - cyl - fus.

S 3 O

S 4 avec pépins - apprène

S 5 3 jus: inc. - coleré.

Fédoncule , L- M C-

Imminuburfil

Rossignola DESIGNATION: clos 4 Planche 26 Rang \$ southe \$ Vigueur: 2 Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3 / 6 Date de maturité: 26-3-66 Pourriture : 0 Pédoncule : 1 Millerandage: GRAPPE : G - M - (2) BAIE : TG - G - M/E, P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - Mi Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 s 22 avec pépins - apyrène. s 30 s 4 1 s 5 6 Jus : inc. - coloré.

dente de la control de la cont

DESIGNATION: Rossignola CLOS 4 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 8 Vigueur: 4 Port : érig - (2 érig) couché. Date de véraison: 12867 Date de maturité : 48,9.67 Pourriture : 0 Pédoncule : Mal Millerandage : 0,5 BAIE: TG-G-M-P. L-M-C disc. - sph. - (11). - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - (Rg) - N. Saveur : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s \* avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 3 2 s 4

	241 372	lacement			···· IIOE	, T () H () T () H	1 4 4 6 6 6 6	J	0 # A + + + +		
= :		! Nombre									
		total	26,3		!!!!	!	!	!!!	!		
e Tujeri	1	5	11		!!!	1	!	!	!		
	2	4	2/4			į	1	į			
	3	4	. 2 . !			i	:	!			
,	4	,				!	!	!	1		
	5 !	5	! ! ! ! / !		!!!	!	! !	!			

almatan/imitaa/uataa/uutaa/

Année / 1968
Emplacement ...4.2658 ..... Désignation Rossignala

	Nombre total	Dates						
		! 193	13,4	1	1			
1	16	! 0	11		1	1		
2	19	0	13 !	į	1	1		
3	16	0	13.	į	i	1		
4	14	0	13. 1	İ	1	1		
5	! 10	1	16. 1	i	i	1		

De 3-4-682 +10

Désignation:
Emplacement: 4.2658 12

## (A). BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabro 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabros 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9)
- blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 lus à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Rassignola

Emplacement: 4.26 \$8 4.2

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Øduveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 autre 9.

ldmindonindmiadmiadmiad

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕄

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo imi 65

Rossignala

Désignation : Emplacement :

4.26 58 3.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3 quelques ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

rouge foncé 4. 52 - bourgeon : coloré () - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Rossiqualer Emplacement: 4.2658 A 1

#### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

- 34 potite 1 moyenno 2 grando 3.

  Face supériours: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 34 Faco inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

almateo banta alamta alamta al

- Limbe: plan 17 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournonté 5.
- 36 Surface: unio 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 57 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Coulcur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8totalement 8.
- 40 aranócux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Dermer 8.65

Emplacement: 4.2658 x.2 Désignation: Rossignala

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2)- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

douted anterdestantenturb

82

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

## BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir Fronglike

27 - Très pruinéc 7 - pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière (3)- irrégulière 4 - cêtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incoloro (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8.65

ideatedantadastadantad

-Calvo 12, 65

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Juntumburti

Domergue 70